

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 8-10-85561674

PUBLICATION PERIODIQUE CPP N° 536 A D

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION "ILE DE FRANCE" ®

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE SAINT-DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE.

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

47, rue Paul Doumer, 93100 MONTREUIL - Tél. 287.76.71

ABONNEMENT ANNUEL : 100 F

Régisseur de Recettes : D.D.A. -

175, Rue du Chevaleret - 75646 PARIS CEDEX 13.
C.C.P. 9063 96 U PARIS.

BULLETIN N° 294 3 OCTOBRE 1985

EDITION GRANDES CULTURES - ENVOI N°15

COLZA :

Les levées ont été irrégulières ,à cause de la sécheresse .

Situation RAVAGEURS :

Grosse Altise : × Situation :

Les premières captures d'adultes en piège datent du 19 Septembre.
Actuellement ,elles sont peu nombreuses et régulières .


MAIS ,localement , les dégâts dus aux morsures ont été importants : le seuil d'intervention a été dépassé dans certaines parcelles.

Les températures élevées ont accéléré les pontes qui commencent à être déposées. Les premières larves devraient apparaître vers le 20 Octobre.

× Stratégie de lutte :

INTERVENEZ :

*contre les morsures d'adultes :



En cas de levées irrégulières (avant le stade 2 feuilles) :

.si le seuil de 3 pieds sur 10 est dépassé OU

. en renouvellement si la limite de rémanence du 1^{er} traitement est atteinte .

*contre les adultes ,pour limiter les pontes et les dégâts dus aux larves :

GROSSE ALTISE
ADULTE



A partir du stade 2 f. si vous capturez encore des adultes dans les pièges.

Remarque : A partir du stade rosette et durant tout l'hiver :

LARVES DE
GROSSE ALTISE



Si les adultes ont été mal contrôlés : envisagez un traitement de rattrapage sur les larves , lorsque 2 plantes sur 3 présentent une galerie de larve.

(Ce traitement permet d'intervenir aussi sur les larves de Charançon du bourgeon terminal -voir ci-dessous -)

Produits à utiliser :

parathion éthyl huileux : 350 g de m.a. /ha
 parathion méthyl huileux : 300 g de m.a. /ha

Charançon du bourgeon terminal :

En 1984 , ce ravageur a été signalé autour de Bray sur seine. Afin de repérer la future zone à risque , *continuez de guetter sa présence* , en surélevant la cuvette .

Mouche du chou :

Nos prévisions du bulletin n°292 sont confirmées : les piégeages sont très importants (dans le Sud de la Seine et Marne essentiellement).

Le seul moyen de lutte actuel était l'utilisation de microgranulés au semis. Toutefois , la sécheresse les rend pratiquement inefficaces.

Dès à présent , et dans les mois à venir , *recherchez les larves* (asticots blancs de 2 à 7 mm qui creusent des galeries au niveau du collet) , et signalez nous les dégâts que vous pouvez rencontrer .

Des études sont en cours pour mettre au point une lutte en végétation.

Puceron cendré :

Des colonies importantes sont signalées .

Si vous avez :

- des déformations foliaires et des populations très nombreuses
- dans des cultures mal implantées , qui souffrent du manque d'eau ,

Intervention possible avec des produits spécifiques :

NEXION 25 ou RHODIANEX (bromophos) à 21/ ha
 AZOPHENE Flo ou ZOLONE Flo (phosalone) à 1,2 l/ ha
 PIPIMOR G (pyrimicarbe) à 500 g /ha

Situation MALADIES :Mildiou :

Région Est de la Seine et Marne :

Dans les parcelles de colza bien implantées , (levées régulières, stade 4 f.), les brouillards matinaux favorisent le développement de mildiou sur cotylédons et premières feuilles .

A ce stade , des températures moins clémentes enrayeront la maladie naturellement *le traitement n'est pas rentable.*

CEREALES :Jaunisse nanisante de l'orge :

× Situation :

Le vol des pucerons vecteurs de la jaunisse nanisante a repris vers le 10 Septembre , soit 15 jours plus tôt que l'an dernier . Les conditions météorologiques sont très favorables à leur multiplication .

Les risques d'infestation des céréales sont élevés cette année .

Ayant quitté les maïs et les repousses , les pucerons atteignent les premiers semis levés.

3.

× Lutte :

Pour limiter les contaminations , il faut :

- détruire rapidement les repousses .
- broyer et enfouir les cannes de maïs .

Nous vous rappelons que les semis précoces sont les plus exposés aux insectes.

Dès la levée , surveillez chaque semaine les pucerons . Si 10% des plantes comportent au moins un puceron , *intervenez rapidement* .

Maintenez ensuite la surveillance pour renouveler éventuellement le traitement si les pucerons reprennent leur activité .

Produits homologués :

M. active	Spécialité	Firme	Dose / ha
cyperméthrine	KAFIL SUPER	La Quino	0,2 l
	SHERPA 10	Pépro	0,2 l
	CYMBUSH	Sopra	0,2 l
bromophos	NEXION 25	Basf	1,5 l
	NEXION 40	Basf	1 l
	RHODIANEX	Rhodiagri	1,5 l
deltaméthrine	DECIS	Procida	0,3 l
fenvalérate	SUMICIDIN 10	Agrishell	0,25 l
perméthrine	AMBUSH	La Quino	0,25 l
fluvalinate	MAVRIK	Sandoz	0,2 l
cyfluthrine	BAYTHROÏD	Bayer	0,3 l

Ces deux derniers produits ont tous deux : une action de choc , une rémanence de trois semaines , et des conditions d'utilisation identiques . Ils sont compatibles avec les herbicides.

Intervenez sur végétation sèche , en étant assuré d'avoir 1/2 h. sans pluie après le traitement.

Mouche grise des céréales :

Appréciation du danger pour 1986 :

1^{ère} série d'éléments CONNUS à considérer = conditions des pontes .

× les pontes des adultes sont favorisées par un été sec .

En août 85 , la fréquence des pluies a été élevée , mais les quantités recueillies sont déficitaires , surtout dans le Sud Seine et Marne. Toutefois , à signaler qu'en Août 84 , le déficit régional moyen était encore plus important .

En conséquence , les pontes ont dû être très légèrement favorisées cette année. Les possibilités de ponte début Septembre ne sont pas non plus à négliger .

× les pontes ont lieu sur des terrains nus ou peu couverts : les précédents favorisants sont ceux récoltés tôt (ex: pois) ou couvrant peu le sol en début d'été (ex: betterave) . Vous pouvez donc évaluer le risque particulier de votre parcelle.

P54

4.

- Hiver froid : dégâts souvent sévères

→ Hiver doux : dégâts souvent peu importants (car sorties échelonnées des larves)

La seule recommandation actuelle est un traitement de semences aux doses correctes .

Toutefois, l'avenir devrait nous apporter des nouvelles modalités de traitements en végétation.

× × × × × × × × × ×

Attendez d'avoir reçu un avis de réinscription pour envoyer votre renouvellement d'abonnement.

Merci

REPONDEUR EN MARCHÉ : Appelez le 858-06-15